




Sanichlor TABLETE ZA DEZINFEKCIJU NA BAZI AKTIVNOG HLORA

DEZINFEKCIJA VODE ZA PRANJE SALATE, POVRĆA I NEOLJUŠTENOG VOĆA



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1. Svežom i hladnom vodom za piće temeljno isprati povrće i voće kako bi se odstranilo što više ostataka i nečistoća.
2. Pri rukovanju sredstvom koristiti zaštitne naočare i rukavice.
3. Pripremiti radni rastvor sredstva Sanichlor dodajući odgovarajući broj tableta na određenu količinu vode:

3 PREPORUČENA RADNA KONCENTRACIJA			
Broj tableta na 10L vode	Daje aktivnog hlora	Neophodna minimalna količina aktivnog hlora	Preporučeno vreme kontakta
1	30 ppm	24 ppm	15 min
2	60 ppm	48 ppm	10 min
3	90 ppm	72 ppm	5 min

4. Potopiti salatu, povrće i neoljušteno voće u pripremljeni radni rastvor i ostaviti da odstoje preporučeno kontaktno vreme.
5. Isprati sa dosta sveže, hladne vode za piće. Konzumirati povrće u kratkom vremenskom periodu.

Redovno menjati vodu za pranje (preporučeno posle svake nove šarže) i proveravati koncentraciju.

NAPOMENA / INFORMACIJA

Samo za profesionalnu upotrebu!
Područje primene: Dezinfekcija vode za pranje salate, povrća i neoljuštenog voća.

Ne mešati sa drugim proizvodima!
Odlagati samo praznu i zatvorenu ambalažu. Ostaci proizvoda: pogledati bezbednosni list.

Aktivna supstanca: 100 g Sanichlor tableta sadrži 50.0 g natrijumdihlorizocijanurata. Bezbedno koristi biocidni proizvod. Pre korišćenja pročitaj etiketu i podatke o proizvodu.
1 tableta sadrži 500 mg Natrijumdihlorizocijanurata.

BEZBEDNOST

Za više informacija o bezbednosti pročitajte deklaraciju i bezbednosni list.

SKLADIŠTENJE

Čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na temperaturi 0-40°C.

PAKOVANJE

12x80 tableta (10 blister pakovanja po 8 tableta)



Sanichlor

TABLETE ZA DEZINFEKCIJU NA BAZI AKTIVNOG HLORA


Sanichlor tablete se brzo rastvaraju u vodi. Povećavaju efikasnost održavanja higijene u procesu pripreme hrane i u samom radnom prostoru.

Sanichlor tablete brzo deluju zahvaljujući širokom spektru biocidne aktivnosti. Veoma efikasno sredstvo protiv bakterija, bakterijskih spora, algi, gljivica, protozoa i virusa.


- **Čisto** – Dobri higijenski rezultati zahvaljujući biocidnom efektu.
- **Bezbedno** – Povećana bezbednost na radu zahvaljujući širokom spektru biocidnog delovanja.
- **Efikasno** – Maksimalan nivo higijene pri malim radnim koncentracijama.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



5. PREPORUČENA RADNA KONCENTRACIJA		
1 TABLETA U	AKTIVNOG HLORA	PODRUČJE PRIMENE
25 ml vode	12.000 ppm	Telesne izlučevine i tvrdokorna zaprljanja
250 ml vode	1200 ppm	Opšta dezinfekcija
625 ml vode	480 ppm	WC, odvodi, sanitarije
1.25 L vode	240 ppm	Površine za pripremu namirnica
2.0 L vode	150 ppm	Flašice za bebe
2.5 L vode	120 ppm	Krpe, mopovi



1. Za detaljnija uputstva o upotrebi pogledati higijenski plan.
2. Odstraniti grube nečistoće i ostatke namirnica.
3. Pri rukovanju sredstvom koristiti zaštitne rukavice i naočare.
4. Detaljno isprati hladnom vodom kako bi uklonili nečistoće.
5. Pripremiti radni rastvor sa hladnom ili mlakom vodom kako je prikazano u tabeli. Mešanje će smanjiti vreme rastvaranja tablete.
6. Prebrisati površinu radnim rastvorom. Ostaviti da deluje najmanje 5-15 minuta.
7. Isprati površinu svežom, čistom vodom.

NAPOMENA:

PRIPREMATI REDOVNO SVEŽ RADNI RASTVOR ZA SVAKU NOVU ŠARŽU JER MU SE SMANJUJE EFIKASNOST. VODITI RAČUNA DA SE RASTVOR NE PROSIPA – IZBELJUJE TEKSTIL. IZBEGAVATI DUŽI KONTAKT SA METALIMA.

NAPOMENA / INFORMACIJA

Isključivo za profesionalnu upotrebu!

Područje primene: Sve površine otporne na vodu osim površina izrađenih od aluminijuma i bakra. Ne mešati sa drugim proizvodima! Odlagati samo praznu i zatvorenu ambalažu. Ostaci proizvoda: pogledati bezbednosni list.

Aktivna supstanca: 100 g Sanichlor tableta sadrži 50.0 g natrijumdihlorizocijanurata. Bezbedno koristi biocidni proizvod. Pre korišćenja pročitaj etiketu i podatke o proizvodu. 1 tableta sadrži 500 mg Natrijumdihlorizocijanurata.

BEZBEDNOST

Za više informacija o bezbednosti pročitajte deklaraciju i bezbednosni list.

SKLADIŠTENJE

Čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na temperaturi 0-40°C.

PAKOVANJE

12x80 tableta (10 blister pakovanja po 8 tableta)